

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO

# BIG BORO PLUS 3.8%

FERTILIZANTE FOLIAR Y FERTIRIEGO

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

	p/v
Nitrógeno Total.....	5,80%
Nitrógeno Ureico (N-NH <sub>2</sub> ).....	5,80
Boro (B).....	3,80%
Molibdeno (Mo).....	0,60%

Densidad: 1.17 g/ml a 20°C

Contiene: 102 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

Contenido neto: ( ) 1 L, ( ) 10 L, ( ) 20 L

## MANTENGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS

FORMULADO POR:

**BRANDT®**

Brandt Consolidated Inc.  
2935 S. Koke Mill Rd.  
Springfield, IL 62711 USA  
(217) 547-5840

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Visión,  
Agrícola,  
S.A. de C.V.**

Urbanización Florida,  
Pje. Las Palmeras, Edif. G+H,  
local N° 5, segunda planta,  
San Salvador. Tel.: 2260-2770

PAIS:

El Salvador  
Guatemala

Nº DE REGISTRO

FERT.2018-11-1980  
909-F-5288-29

## PRIMEROS AUXILIOS:

**Si es ingerido:** Si la persona está consciente y alerta, administrar agua o leche para diluir, y luego inducir el vómito. Contactarse inmediatamente con un Centro de Toxicología o un médico. No administre nada en forma oral a una persona inconsciente.

**Si es inhalado:** Lleve a la persona afectada a respirar aire fresco. Si no respira, suministrar respiración artificial y respiración boca a boca hasta recibir atención médica.

**Si contamina sus ojos:** Lave con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste busque atención médica.

**Si contamina su piel:** Quitar la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Llame a un centro de toxicología o a un médico para recibir tratamiento en caso de que la irritación persista.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y EL AMBIENTE:

No comer, fumar o beber durante el manejo, preparación y aplicación del producto. No contaminar fuentes de agua, como ríos, lagos, etc. Luego de utilizado el producto, realizar el triple lavado de los envases y eliminarlos de acuerdo a las instrucciones de las autoridades competentes. Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos o mucosas (nariz y boca), lave con abundante agua. De presentarse irritación, procure atención médica. Siempre utilice equipos de protección individual (mameluco, guantes impermeables, anteojos, máscara y botas) al efectuar las aplicaciones.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases originales debidamente cerrado y abrílos solamente en momento de su preparación.

## INSTRUCCIONES DE USO:

**BIG BORO PLUS 3.8%** es un fertilizante ideado para la aplicación foliar de Boro y Molibdeno en todos aquellos cultivos que presenten deficiencias. Los cuales ayudan a las plantas a convertir el nitrógeno en amonio y así mejorar el metabolismo del nitrógeno. Resultado: mejora la nodulación, mayor floración y fructificación, e incremento del rendimiento.

## CULTIVOS:

### Cultivos Anuales:

Algodón (*Gossypium herbaceum*), Arroz (*Oryza sativa*), Cebolla (*Allium cepa*), Güisquil (*Sechium edule*), Chiles (*Capsicum* sp), Frijol (*Phaseolus vulgaris*), Maíz y Maíz dulce (*Zea mays*), Melón (*Cucumis melo*), Mora (*Rubus* sp), Papa (*Solanum tuberosum*), Pepino (*Cucumis sativus*), Sandía (*Citrullus lanatus*), Tomate (*Lycopersicon esculentum*), Zanahoria (*Daucus carota*) y Crucíferas.

Dosis: 1.0 a 2.0 Lt/Ha (0.7-1.4 Lt/Mz)

### Cultivos Perennes:

Café (*Coffea arabica*), Caña de Azúcar (*Sacharum officinarum*), Banano (*Musa spp*), Citricos (*Citrus* sp), Mango (*Mangifera indica*), Papaya (*Carica papaya*), Piña (*Ananas sativus*), Fresa (*Fragaria* sp).

Ornamentales: Helechos (*Pteridium aquilinum*), Palmeras (*Areaceae* sp.), Clavel (*Dianthus caryophyllus*), rosas (*Rosa* sp.), Hortencia (*H. macrophylla*), orquídea (*Cattleya* sp.), Palma africana (*Elaeis guineensis*),

Dosis: 1.0 Lt/Ha (0.7 Lt/Mz).

## APLICACIONES AÉREAS:

Cultivos	Dosis/ha
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	0.5-3.0 L (0.35-2.1 L/mz)
Banano ( <i>Musa</i> sp)	0.5-3.0 L (0.35-2.1 L/mz)
Caña de Azúcar ( <i>Sacharum officinarum</i> )	0.5-3.0 L (0.35-2.1 L/mz)

Las dosis indicadas en esta etiqueta son orientadas, pudiéndose variar según análisis foliar y el asesoramiento del Ingeniero Agrónomo responsable.

## FORMA DE APLICACIÓN Y PREPARACION DE LA MEZCLA:

Se puede aplicar con equipo terrestre y por aplicación aérea. Este producto también se puede aplicar por fertiriego.

Llene el tanque de la cantidad de este producto recomendada y agregue agua al tanque hasta la mitad. Si es necesario, se pueden agregar otros productos compatibles. Llenar el tanque hasta capacidad final, con agitación continua.

Evite aplicar en horas del día con temperaturas elevadas, baja humedad relativa y/o vientos.

Para aplicaciones foliares aéreas utilice un volumen mínimo de 20 L/ha (14 L/mz) de agua.

**INCOMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común por lo que puede ser aplicado conjuntamente en distintos tratamientos fitosanitarios. Se recomienda leer la etiqueta de los productos con los cuales se tiene interés en mezclar, para analizar su compatibilidad. Evite mezclas con fosfatos ó soluciones excesivamente alcalinas. Evite el contacto con Agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD:** No es Fitotóxico, aplicados en las dosis recomendadas. Se recomienda no sobredosificar.

**No. Lote:**

**Fecha de formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**