

PRECAUCIONES, LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

NO APLICAR DIRECTAMENTE, NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA. NO APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS.



NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE. NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO.

LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Para ayudar a evitar accidentes:

- 1- Almacene el producto en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños y animales.
- 2- Aplicar el producto en lugares estratégicos protegido a la destrucción de niños y animales.
- 3- Siga las instrucciones adjuntas.
- 4- Evite el contacto de su piel con el producto.
- 5- Nunca lo almacene con alimento y destruya los envases vacíos.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Este producto puede afectar el mecanismo de coagulación de la sangre manifestándose por hemorragias.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Provocar el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal, luego tocando la parte de atrás de la garganta. En Costa Rica: No provoque el vómito, ofrecer dos vasos de agua y acudir al médico de inmediato. En caso de ausencia de atención médica, provocar el vómito dando de beber suficiente agua tibia con sal y luego tocando la parte de atrás de la garganta.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar ventilado y seco manténgalo en reposo y en posición horizontal.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con suficiente agua limpia durante 15 minutos como mínimo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Este producto contiene un anticoagulante que interfiere con la síntesis de protombina. Aplicar vitamina K1 intramuscular u oral, transfusiones de sangre y terapia de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAIS	INSTITUCION	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-891-0029832
BELIZE	Centro de Intoxicación Karl Hausner	231548
	Memorial Hospital	231639
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Secretaría de Recursos Naturales	
	Sanidad Vegetal	311006
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	289 4514
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	22231028
PANAMA	Centro de Investigación e Investigación de Medicamentos	269 2741

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

Ramik®
green
RODENTICIDA - DIFACINONA
PELLETS



Composición Química:	p/p
2 - (diefenilacetil) indan - 1,3 diona	0,005 %
Ingredientes Inertes	99,995%
Total	100,000%

Contiene: 0.05 gramos de ingrediente activo por kilogramos de producto comercial.

Registrado por:	N° de Registro
Agrobiotek Laboratorios	
Guatemala, Guatemala.	1,122-2
Neogen Corporation	
Belize City, Belize	0200-1
Neogen Corporation	
San Salvador, El Salvador	CAS.2003-09-215
UAP de Honduras.	
Tegucigalpa, Honduras	581-F-293-TIII
Productos El Sol	
Managua, Nicaragua.	IV-1578-B-2002
Vetim, S.A.	
San José, Costa Rica.	MS 1005-P-524
Empresas Melo, S.A.	
Panamá, República de Panamá.	RO-66-00

Importado y Distribuido por:	Teléfono:
Nutrifert Guatemala	
Guatemala, Guatemala	Tel.: (502) 2320-6555
Neogen Corporation	
Belize City, Belize	Tel.: (501) 523-216612003
Visión Agrícola, S.A. de C.V.	
San Salvador, El Salvador	Tel.: (503) 2260-2770
Nutrifert Honduras	
Tegucigalpa, Honduras	
Cisa Agro	Tel.: (505) 276-8710
Managua, Nicaragua	
Vetim, S.A.	
San Jose, Costa Rica	Tel.: (506) 2221-3750
Empresas Melo, S.A.	
Panamá, República de Panamá	

CONTENIDO NETO: 50 g

INSTRUCCIONES DE USO:

Rodenticida de uso domestico para el control de ratas y ratones, adentro y fuera de las casas.

Para el control de ratas de Noruega, ratas de tejado y ratones domésticos, puede utilizarse dentro y alrededor de hogares, bodegas industriales, edificaciones y similares.

Usos recomendados para: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

Este producto es para control de:

- Ratas de Noruega (*Rattus norvegicus*)
- Ratas de techo (*Rattus rattus*)
- Ratas de casa (*Mus musculus*)

SELECCIÓN DE AREAS DE TRATAMIENTO:

Determine áreas donde las ratas o los ratones transitan en busca de alimentos. Generalmente estas están a lo largo de paredes, aperturas roidas, en o al lado de madrigueras, en rincones y lugares escondidos, entre pisos y paredes o en ubicaciones donde los roedores o sus señales han sido vistas.

Elimine desperdicios de alimentos u otros productos que pueden servir de alimento alternativo a los roedores.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Ratas: Coloque de 50 a 100 gr. de cebo RAMIK (por rata). Coloque de 50 a 200 gr. de cebo RAMIK por estación para controlar la colonia a una distancia de 3 a 5 metros entre estaciones. Mantenga un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante por lo menos 10-15 días.

Ratones: Coloque de 12 a 15 gr. de cebo RAMIK (por ratón). Coloque 50 gr. de cebo RAMIK por estación para controlar la colonia a una distancia de 3 a 5 metros entre estaciones.

Mantenga un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante por lo menos 15 días.

Nota: El número de cebos que usted deberá colocar por estación, dependerá de la población o grado de infestación.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Acceso inmediato.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben destruirse y entregados a Centro de Acopio más cercano previo triple lavado. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, estos deben ser eliminados en lugares autorizados por el Ministerio de Salud.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, el fabricante y formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

PAIS NÚMERO DE REGISTRO
EL SALVADOR CAS.2003-09-215

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FORMULADO EN:
HACCO INC., 110 HOPKINS DRIVE, RANDOLPH, WI 53956, USA.

